


HÁBITOS SEXUALES EN HOMBRES CON DISFUNCIÓN ERÉCTIL¹

La encuesta "Global sobre Hábitos Sexuales", en la que participaron 1.458 hombres que tomaban un medicamento para tratar la DE entre 40 y 70 años de Brasil, China, Italia, Japón, Rusia, Taiwán y Turquía, fue publicada en The Journal of Urology el 09 de mayo de 2016 y arrojó los siguientes resultados.




Los hombres encuestados no restringían sus actividades sexuales, sino que las planificaban de manera proactiva.




4 de cada 5 encuestados siempre o algunas veces planificaron con anticipación un tiempo específico para tener relaciones sexuales.



7 de cada 10 de los hombres encuestados normalmente tuvieron relaciones sexuales dentro de la hora de haber tomado el medicamento y casi todos los hombres (96%) tuvieron relaciones sexuales dentro de las cuatro horas posteriores a la administración del mismo.



La mayoría de los usuarios de medicamentos para la DE que fueron encuestados planearon un día específico de la semana (55%) y un momento específico del día (60%) para tener relaciones sexuales.



71% de los usuarios de la medicación suele planear un tiempo para tener relaciones sexuales, con hasta varias horas de antelación.



6 veces / mes

La frecuencia promedio de las relaciones sexuales de los usuarios de medicamentos para la DE en esta encuesta es de seis veces al mes.



Los encuestados consideraron que los atributos más importantes de su medicamento para la DE son las erecciones rígidas (94%), el bajo nivel de efectos secundarios (90%) y un efecto rápido (89%).



Los resultados de esta encuesta revelaron que este grupo de hombres no necesariamente busca ser sexualmente espontáneo, sino que disfrutan planificando el acto sexual y sabiendo qué esperar.

Referencia:

1. Mullhall JP, Hassan TA. Understanding the Sexual Habits of Men Taking Medication for Erectile Dysfunction (ED): Survey Results from 7 Countries. J. Urol 2016. Volume 195, Issue 4, Supplement.



ESSENTIAL HEALTH